

## Anexos

<b>Resumen de Apósitos Recomendados</b> (Tablas 1, 2, 3 y 4) <small>(Nombre comercial/fabricante o distribuidor)</small>	
Tipo de Epidermólisis Bullosa	Apósito Recomendado
<b>EB Simple Localizada y Generalizada</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● zonas con ampollas — Spycra Protect (ReSkin/Bullen healthcare) o Kerralite Cool (Crawford Healthcare)</li> </ul>
<b>EB Simple – Severa Generalizada</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Spycra Protect (ReSkin/Bullen Healthcare);</li> <li>● Heridas abiertas — PolyMem (Oasis Dist SL)</li> </ul>
<b>EB Juntural</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Lactantes y zonas con ampollas erosionadas - IntraSite Conformabl;</li> <li>● Heridas crónicas o agudas — PolyMem;</li> <li>● Lechos ungueales abiertos — Kytocel si hay sangrado;</li> <li>● Mepitel One o Cuticell Contact</li> </ul>
<b>EB Distrófica</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Heridas crónicas o agudas — PolyMem.</li> <li>● Superabsorbente — Cutimed Siltec</li> </ul>
<b>Apósitos recomendados para los Neonatos con EB</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● PolyMem</li> </ul>
<b>Tratamientos antimicrobianos recomendados para heridas infectadas y fuertemente colonizadas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● PolyMem, Flaminal, Prontosan X, Octenilin</li> </ul>
<b>Tratamiento de la humedad/exudado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Cutimed Siltec, PolyMem Max (se debe evaluar la piel perilesional para detectar la presencia de maceración, especialmente cuando se usa PolyMem ya que inicialmente estimula el exudado)</li> </ul>
<b>Tratamiento de elección para las heridas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● PolyMem, Flaminal Hydro/Forte</li> </ul>

**Tabla 5: Apósitos recomendados para los pacientes con síndrome de Kindler\* ✓**

Tipo de apósito	Marca	Fabricante	Indicación/ función	Contraindicaciones/ comentarios	Tiempo de uso
Malla de silicona suave	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mepitel</li> <li>Adaptic Touch</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mölnlycke Health Care</li> <li>Acelity</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Humedece la herida</li> <li>Adecuado para la mayoría de las heridas secas</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Hasta 4 días en neonatos</li> <li>Es menos probable que los niños mayores/ adultos necesiten tales apósitos, pero si se usan, se deben cambiar de acuerdo con la preferencia del paciente</li> </ul>
Lipido-coloides	<ul style="list-style-type: none"> <li>UrgoTul</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Urgo Medical</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Capa de contacto con la herida</li> </ul>		
Membrana polimérica	<ul style="list-style-type: none"> <li>PolyMem</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Qasis Dist SL</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Heridas crónicas y agudas</li> <li>Heridas en las que es necesario limpiar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Estimula altos niveles de exudado</li> <li>Un olor diferente no necesariamente indica infección</li> <li>Puede ser difícil de retener en superficies verticales</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cambiar con frecuencia hasta que el exudado se reduzca</li> <li>Protege la piel perilesional</li> </ul>
Espuma de silicona suave	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mepilex/ Mepilex Lite/ Mepilex Transfer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mölnlycke Health Care</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controla el exudado</li> <li>Protección</li> </ul>		
Apósitos con borde de espuma	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mepilex Border/ Mepilex Border Lite</li> <li>Allevyn Gentle Border</li> <li>Biatain Silicone Border</li> <li>Kerafoam</li> <li>UrgoTul Absorb Border</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mölnlycke Health Care</li> <li>Smith &amp; Nephew</li> <li>Coloplast</li> <li>Keraplast</li> <li>Urgo Medical</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Heridas aisladas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Heridas secas o con poco exudado</li> </ul>	

**Tabla 6: Recomendaciones para la sujeción de los apósitos**

Tipo	Marca	Fabricante	Indicaciones/ función	Contraindicaciones/ comentarios
Vendaje	<ul style="list-style-type: none"> <li>K-Band</li> <li>Easifix-K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Urgo Medical</li> <li>BSN medical</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Soporte y sujeción del apósito</li> <li>Usar un ancho de 2,5 cm para envolver a mano</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proteger la piel seca con emoliente antes del vendaje</li> <li>Cubrir todas las heridas antes de vendar para evitar la adhesión</li> </ul>

Vendaje tubular	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Tubifast estiramiento bidireccional</li> <li>· ComfiFast MultiStretch CliniFast</li> <li>· ActiFast estiramiento bidireccional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Mölnlycke Health Care</li> <li>· Synergy Health</li> <li>· CliniSupplies</li> <li>· Activa Healthcare</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Soporte y sujeción del apósito</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Igual que el anterior</li> </ul>
Prendas de vestir	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Skinnies WEB</li> <li>· Skinnies</li> <li>· Dreamskin</li> <li>· DermaSilk</li> <li>· Tubifast garments</li> <li>· ComfiFast Easywrap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Skinnies UK</li> <li>· Dreamskin</li> <li>· Espère Health Care</li> <li>· Mölnlycke Health Care</li> <li>· Synergy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Skinnies fabrica una gama de prendas diseñadas con equipos clínicos y grupos de pacientes, específicamente para pacientes con EB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Igual que el anterior</li> </ul>
Vendaje cohesivo	<ul style="list-style-type: none"> <li>· ActiWrap</li> <li>· Coflex Haft</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Activa Healthcare</li> <li>· Andover Healthcare</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Soporte y sujeción del apósito</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Aplicar sin apretar en exceso o tendrá un efecto de torniquete</li> </ul>
Esparadrapo de silicona suave	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Siltape</li> <li>· Mepitac</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Avancis Medical</li> <li>· Mölnlycke Health Care</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Usar en lugar de esparadrapo adhesiva normal</li> </ul>	

**Tabla 8: Cuidado de los pacientes con EB en quirófano ✓**

Procedimiento	Medida	Justificación	Comentarios
Monitarización de ECG	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Electroodos adhesivos directamente en la piel</li> <li>· Corte la parte adhesiva del electrodo y fíjela con esparadrapo de silicona</li> <li>· Pegue los electrodos a la capa de contacto de silicona, p. ej., Mepitel One (Mölnlycke Health Care)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Para lograr un control efectivo sin dañar la piel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Pegue solamente los electrodos directamente sobre la piel si se dispone de SMAR</li> <li>· Cuando no se disponga de SMAR, cubra las heridas abiertas con un apósito no adhesivo antes de vendar</li> </ul>
Toma de de la tensión arterial	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Coloque la capa de acolchado como Velband/Softban debajo del manguito</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Para minimizar el daño en la piel y reducir el riesgo de ampollas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Cubra las heridas abiertas con un apósito no adhesivo antes de aplicar Velband</li> <li>· Donde sea posible, evite colocar el manguito sobre la zona herida</li> </ul>
Medición de la saturación de oxígeno	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Cubra el dedo con envoltura alimentaria de plástico comercial o Mepitel One (Mölnlycke Health Care)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Para evitar daños en la piel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Aplicar debajo de la sonda</li> </ul>
Protección de los ojos y los párpados	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Aplicar gotas/ungüentos lubricantes</li> <li>· Cubrir con apósito húmedo no adhesivo o Neoheal (Laser Physics)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Para reducir el riesgo de daño en los párpados o abrasiones en la córnea</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Omita la lubricación en niños pequeños</li> <li>· Advierta a los niños mayores o adultos sobre la visión borrosa al recuperarse</li> </ul>
Venopunción	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Evite el uso de compresor o guante</li> <li>· Apriete la extremidad firmemente, evitando las fuerzas de cizalla</li> <li>· Evite frotar excesivamente durante la preparación de la piel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Para minimizar el traumatismo en la piel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Envuelva el apósito/banda suave alrededor de la extremidad antes de comprimir</li> <li>· Cubra las zonas abiertas o ampolladas con un apósito no adhesivo antes de aplicar la capa protectora</li> </ul>

Sujeción/fijación de la cánula y del equipo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mepitel Film (Mölnlycke Health Care)</li> <li>Use esparadrapo de silicona suave</li> </ul> <p>(ver Tabla 6, página 25)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Use envoltura alimentaria de plástico comercial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Para evitar desprender la piel</li> <li>Sujeción</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Puede necesitar usar SMAR si la piel es muy frágil</li> <li>Si no se dispone de SMAR y se usa adhesivo, aplique un 50 % de líquido/50 % de parafina suave y blanca para humedecer el esparadrapo y retirarlo lentamente</li> <li>Utilice clingfilm si no se dispone de esparadrapo de silicona suave o SMAR</li> </ul>
Uso de mascarilla	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aplicar Mepitel One (Mölnlycke Health Care) o Cuticell Contact (BSN Medical) o Vaseline (Unilever) sobre la cara y el mentón</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Para evitar fuerzas de cizalla al usar una máscara facial (especialmente cuando hay un cambio de personal)</li> <li>Para evitar la formación de ampollas debido a la máscara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Puede necesitar SMAR estéril (Appeel Sterile, CliniMed) para retirarla si la piel es muy frágil</li> <li>Tenga cuidado durante el cambio de personal ya que la máscara puede resbalar</li> <li>Lubrique los guantes para evitar que los guantes se adhieran a los apósitos o a la piel</li> </ul>

**Tabla 9: Manejo de las zonas de gastrostomía** ✓

Tipo de apósito	Marca	Fabricante	Indicaciones/función	Contraindicaciones/ comentarios
Protector: cremas, pulverizados, películas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Protector cutáneo Proshield Plus</li> <li>Partes iguales de sucralfato/ Cavioln</li> <li>Crema protectora duradera/ película protectora no irritante (pulverizador)</li> <li>Sorbaderm</li> <li>Sillesse</li> <li>Crema protectora Medihoney</li> <li>50 % parafina suave y blanca/50 % parafina líquida</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Smith &amp; Nephew</li> <li>In-house pharmacy</li> <li>3M Health Care</li> <li>Aspen Medical Europe</li> <li>ConvaTec</li> <li>Derma Sciences</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Protección</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Algunos pacientes pueden experimentar picor cuando se aplica a la piel muy tierna</li> <li>Evitar el contacto con el dispositivo de gastrostomía</li> <li>Puede dificultar la sujeción de los apósitos</li> </ul>
Malla de silicona suave	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mepitel</li> <li>Adaptic Touch</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mölnlycke Health Care</li> <li>Acelity</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Capa de contacto con la herida</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Use doble capa con los poros en la malla no alineados si hay exceso de granulación en el tejido</li> </ul>
Lipido-coloides	<ul style="list-style-type: none"> <li>UrgoTul</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Urgo Medical</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Capa de contacto con la herida</li> </ul>	
Superabsorbente	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sorbion Drainage</li> <li>Sorbion Sachet S</li> <li>Cutimed Siltec</li> <li>KerraMax Care</li> <li>Flivasorb</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>BSN Medical</li> <li>Crawford Healthcare</li> <li>Activa Healthcare</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Supuración</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Usar sobre apósito primario</li> <li>Usar sobre apósito de drenaje superabsorbente</li> </ul>
Crema de esteroides	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pomada para ojos Maxitrol</li> <li>Dermovate</li> <li>Cutivate</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alcon Laboratories</li> <li>Glaxo Wellcome UK (Glaxo Labs)</li> <li>PharmaDerm (Fougera Pharmaceuticals)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tejido con exceso de granulación</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Según sea necesario: no más de 7 días</li> </ul>
Crema tópica antifúngica	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nystaform</li> <li>Canesten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Typharm</li> <li>Bayer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cuando la infección por hongos y/o bacterias esté presente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dos veces al día hasta 7 días</li> </ul>

Antifúngico tópico con esteroides	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trimovate</li> <li>Nystaform HC</li> <li>Canestan HC</li> <li>Dermovate NN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>GlaxoSmithKline</li> <li>Typharm</li> <li>Bayer</li> <li>Glaxo Wellcome UK (Glaxo Labs)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tratamiento de las dermatosis que responden a esteroides cuando existe infección por bacteriana/por Candida en niños, adultos y ancianos</li> <li>Tratamiento a corto plazo de las manifestaciones inflamatorias y pruríticas más resistentes en niños (mayores de un año) adultos y ancianos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dos veces al día hasta 7 días</li> <li>Dos veces al día hasta que se produzca una mejora</li> </ul>
Antifúngico oral	Fluconazol	AvKare	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tratamiento y prevención de ciertas infecciones por levaduras y hongos, incluyendo candidiasis vaginal, aftas orales, necrosis fúngica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tomar con o sin alimentos (al menos 2 horas antes de un IBP, por ejemplo, omeprazol) según lo prescrito</li> </ul>

**Tabla 10: Cuidado de la traqueotomía ✓**

Tipo de apósito	Marca	Fabricante	Indicaciones/función	Contraindicaciones/ comentarios
Lipido-coloides	UrgoTul	Urgo Medical	<ul style="list-style-type: none"> <li>Capa de contacto con la herida</li> <li>Usar por debajo de las cintas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Usar tiras anchas para evitar la incrustación</li> </ul>
Malla de silicona suave	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mepitel/Mepitel One</li> <li>Cuticell Contact</li> <li>Adaptic Touch</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mölnlycke Health Care</li> <li>BSN Medical</li> <li>Acelity</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Capa de contacto con la herida</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tejido con exceso de granulación (si se necesita silicona suave, use una doble capa con los poros en la malla desalineados; Silflex)</li> <li>La adherencia puede ser demasiado fuerte para una piel muy frágil</li> </ul>
Espuma de silicona suave	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mepilex Transfer</li> <li>Mepilex Lite</li> </ul>	Mölnlycke Health Care	<ul style="list-style-type: none"> <li>Usar alrededor de la zona del estoma</li> </ul>	
Membrana polimérica	PolyMem	Oasis Dist SL	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alrededor de la zona del estoma para la limpieza y protección</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Consulte con el personal de enfermería de la traqueotomía sobre el grosor de los apósitos por razones de seguridad para evitar el riesgo de decanulación</li> </ul>
Apósito de gelificación	KytoCel	Aspen Medical Europe	<ul style="list-style-type: none"> <li>Infección</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Usar sobre UrgoTul o sobre la malla de silicona suave si hay riesgo de adherencia</li> </ul>
Almohadilla/gel de alivio de presión	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kerrapro</li> <li>Aderma</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Crawford Medical</li> <li>Smith &amp; Nephew</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Daño por la falange del tubo o por las cintas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>No colocar directamente en la herida</li> </ul>

**Tabla 14: Recomendaciones para el tratamiento de la piel perilesional ✓**

Tipo	Marca	Fabricante	Indicaciones/ función	Contraindicaciones/comentarios
Crema protectoras	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proshield Plus</li> <li>Cavilon</li> <li>Crema protectora Medihoney</li> <li>Partes iguales de parafina líquida y parafina suave blanca</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Smith &amp; Nephew</li> <li>3M Health Care</li> <li>Derma Sciences</li> <li>Varios</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Barrera contra líquidos corporales</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Evitar su uso debajo de productos adhesivos ya que puede aumentar la adhesión</li> <li>Las cremas protectoras pueden interferir con la capacidad de los productos de silicona suave para adherirse adecuadamente a la piel y pueden exacerbar la absorción lateral del exudado</li> <li>También hidrata la piel, así que se debe tener cuidado de dejarla "demasiado suave" y aumentar la tendencia a formar ampollas</li> </ul>
Películas protectoras	<ul style="list-style-type: none"> <li>Película protectora aprurítica Sorbaderm</li> <li>Película protectora aprurítica Cavilon</li> <li>Película protectora aprurítica LBF</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aspen Medical Europe</li> <li>3M Health Care</li> <li>CliniMed</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Barrera contra líquidos corporales</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Puede evitar la adherencia de productos de silicona suave</li> </ul>
Productos limpiadores	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pulverizador emoliente Emollin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>CD Medical</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se puede utilizar en la piel intacta y en las heridas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>No requiere enjuagar la piel</li> <li>Usar en lugar de agua sobre la piel dolorida</li> </ul>

**Tabla 11: Recomendaciones para el desbridamiento de las heridas en pacientes con EB**



Tipo de apósito	Marca	Fabricante	Indicaciones/función	Contraindicaciones/comentarios	Tiempo de uso
Hidrogel	<ul style="list-style-type: none"> <li>Muchos disponibles</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>No se recomienda una marca específica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Material necrótico seco</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se debe tener en cuenta la humedad adicional que causa la maceración</li> <li>Puede usarse para desbridar la hiperqueratosis y las zonas de exudado seco</li> <li>Retirar una vez ablandada con pinzas de plástico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1-3 días</li> </ul>
Miel (solo de grado médico)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melloxy</li> <li>Algivon</li> <li>Lámina de gel de miel antibacteriano Medihoney (para heridas sensibles)</li> <li>Mesitran Ointment S</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ideal Medical Solutions</li> <li>Advancis Medical Sciences</li> <li>Aspen Medical Europe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Material necrótico seco</li> <li>Esfacelos blandos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Puede causar picor y dolor</li> <li>Puede aumentar el exudado</li> <li>Puede necesitar un apósito secundario superabsorbente</li> </ul>	
Lámina de hidrogel	<ul style="list-style-type: none"> <li>KerraLite Cool</li> <li>ActiFormCool</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Crawford Healthcare</li> <li>Activa Healthcare</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Como se ha indicado anteriormente, particularmente en las cicatrices de tipo queiloide observadas en la EB pruriginosa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se debe tener en cuenta que el producto se seca y se adhiere al lecho de la herida</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cambiar cuando el producto cambia de color</li> </ul>
Hidrofibra	<ul style="list-style-type: none"> <li>Durafiber</li> <li>Aquacel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Smith &amp; Nephew</li> <li>ConvaTec</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Esfacelos blandos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se debe tener en cuenta que el producto se adhiere al material hiperqueratósico en los márgenes de la herida (por ejemplo, la herida puede estar mojada, pero aun así tener márgenes secos)</li> <li>Riesgo de endurecer las fibras que se adhieren al lecho de la herida; usar un aerosol emoliente para reducir el riesgo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cambiar cuando se haya formado el gel</li> <li>Volver a humedecer si se seca antes de retirarlo</li> </ul>
Alginogel de enzimas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Flaminal Forte</li> <li>Flaminal Hydro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Flen Pharma</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Esfacelos con mucho exudado</li> <li>Esfacelos con poco exudado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mantener alejado de los ojos</li> <li>Seleccione el apósito secundario apropiado según los niveles de exudado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diario inicialmente</li> <li>Disminuir cada 3-4 días</li> </ul>
Membrana polimérica	<ul style="list-style-type: none"> <li>PolyMem</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oasis Dist SL</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Esfacelos blandos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se debe tener en cuenta el aumento inicial del exudado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inicialmente de forma diaria y, posteriormente, reducir la frecuencia según los niveles de exudado</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Almohadilla de desbridamiento de fibra de monofilamento</li> <li>Tela de desbridamiento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Debrisoft</li> <li>UCS debridement</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Activa Healthcare</li> <li>medi UK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Esfacelos blandos</li> <li>Hiperqueratosis y exudado seco</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Humedecer con agua o solución salina</li> <li>Sobre el lecho de la herida hasta 10 minutos según lo tolere</li> </ul>	

nto				
Gusanos estériles	<ul style="list-style-type: none"> <li>Larvas (larvas libres o contenidas en una bolsa de malla con espuma)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bio Monde</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Esfacelos blandos y tejido necrótico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>No se debe usar en pacientes con trastornos de la coagulación, en el tratamiento anticoagulante ni en heridas con vasos sanguíneos expuestos o que sangran fácilmente</li> <li>Los gusanos libres deben estar dentro del lecho de la herida</li> <li>Todos los gusanos deben mantenerse húmedos</li> <li>Puede reducir el rechazo del paciente si están contenidos en una bolsa</li> <li>La terapia larval puede causar dolor</li> </ul>

**Desbridamiento agudo en el quirófano por parte de un cirujano plástico con anestesia general**