

Becur
nalocTM
uñas sanas

- Una sola aplicación diaria
- Sin necesidad de limar

1 Tubo
3 meses de
tratamiento
para 3 uñas

**RESULTADOS VISIBLES A PARTIR
DE LA SEGUNDA SEMANA**

noveloso aplicador de silicona



Agradable y cómodo
Aplicación por encima y
por debajo de la uña
Sin riesgo de contaminación
del contenido



De venta en su farmacia
Consulte a su profesional sanitario
C.P.S. 1583-PS-CM

MEDA

Este producto cumple con la legislación vigente en materia de productos sanitarios



NAL-015/ENE2015



**Tratamiento de
triple acción para
hongos en las uñas**

- Antifúngico ¹
- Reduce la decoloración ²
- Fortalece y alisa las capas
externas de la uña ²



1 Tubo
3 meses de
tratamiento
para 3 uñas

Becur
nalocTM
uñas sanas



Becur
naloc
uñas sanas

Preguntas frecuentes



COMPOSICIÓN:

propilenglicol
ácido láctico
urea

Acción sinérgica

que permite:

- eliminar los hongos que causan habitualmente infecciones en la uña ¹
- mejorar rápidamente la apariencia de la uña ²

RESULTADOS VISIBLES

Eficacia comprobada ²

Aumenta la hidratación, fortalece y alisa la uña.

Resultados visibles en sólo 2 - 4 semanas

En un estudio realizado en 75 pacientes con hongos en las uñas, el 77% observó mejoría en la apariencia de las uñas en tan solo 2 semanas de tratamiento y el 92% tras 8 semanas. ²

Paciente 1



Paciente 2



Antes del tratamiento

Después de 2 semanas

Después de 4 semanas

Después de 8 semanas

Fotos ilustrativas de 2 pacientes tratados con Naloc.


FÁCIL APLICACIÓN

1 vez al día (por la noche) sin necesidad de limar

Aplicar una fina capa sobre toda la superficie de la uña, incluyendo por debajo de la misma

Usar por un período mínimo de 3-6 meses

Naloc sólo es para uso externo, debiendo evitar su contacto con ojos o mucosas



1.- Hultenby K et al. Mycoses, 57:630-638, Oct. 2014

2.- Faergemann J. et al. JCDISA 2011; 1:59-63

¿Los hongos en las uñas son contagiosos?

Los hongos en las uñas son contagiosos y se pueden propagar de una uña del pie a otra o a una uña de la mano. También se pueden propagar de una persona a otra.

¿La psoriasis en las uñas es contagiosa?

No, una persona no se puede infectar por psoriasis tocando a otra persona infectada.

¿Durante cuánto tiempo debo tratar mis uñas para ver resultados?

Naloc le proporciona uñas visiblemente más sanas en tan sólo 2-4 semanas, pero la duración del tratamiento depende del grado y la extensión de las lesiones en cada uña. Normalmente son necesarios de 3 a 6 meses de tratamiento para lograr una mejoría notable. Para mejores resultados, el tratamiento debe ser mantenido hasta que una uña nueva y sana haya vuelto a crecer.

Para unas uñas sanas... ¡empiece el tratamiento cuanto antes!

¿Puedo usar Naloc sin estar seguro de si tengo hongos?

Si, Naloc mejora la apariencia de la uña, incluso si la decoloración o la deformación es causada por factores distintos a los hongos.

¿Tiene Naloc efectos secundarios o interacciones con otros productos?

Puede aparecer una pequeña decoloración de la uña así como leve irritación temporal de la piel cercana al lugar de aplicación de Naloc. En algunos casos, pequeñas zonas afectadas de la uña pueden separarse de la base de la misma. No se conocen interacciones con otros productos farmacéuticos.

¿Puedo usar esmalte de uñas durante el tratamiento?

No, el esmalte de uñas impide la absorción de Naloc por lo que inhibe su acción.

¿Pueden usar Naloc los niños?

Puesto que no existen estudios sobre la utilización de Naloc en niños, recomendamos consultar al médico antes de iniciar el tratamiento.

¿Se puede utilizar Naloc durante el embarazo y la lactancia?

Si, Naloc solo actúa a nivel local. No obstante, se recomienda consultar previamente a su médico.